

Vespertilion bicolore (*Vespertilio murinus*)



Classe : <i>Mammifère</i>	Protégé : <i>Oui¹</i>	Envergure : 26-33cm
Ordre : <i>Chiroptera</i>	Statut Suisse : <i>VU²</i>	Taille : 4.5-6.6cm
Famille : <i>Vespertilionidae</i>	Statut mondial : <i>LC</i>	Poids : 10-23g

Description

Chauve-souris de taille moyenne, le Vespertilion bicolore se reconnaît par son long pelage dorsal noir givré d'un blanc argenté. Les poils du ventre se démarquent du dos avec une teinte beige à brun jaunâtre. Ses courtes oreilles commencent à l'extrémité des lèvres. La face est relativement sombre et peut aller du brun foncé au noir. En vol, on peut observer des ailes étroites et pointues. Il est aussi appelé « Sérotine bicolore ». Pourtant il n'appartient pas au genre *Eptesicus* comme les Sérotines communes et de Nilsson et possède des différences au niveau de la face et de la forme des oreilles.

Répartition et habitat

En Europe, on le trouve du centre de la France et des Alpes jusqu'à la péninsule balkanique et, au Nord, jusqu'au sud de la Scandinavie. Les populations les plus au Sud n'ont pas traversé la chaîne alpine, mais il y a des individus jusqu'en Grèce. En général, ces mammifères vivent dans des fissures de roches ou de bâtiments, des caissons de stores ou glissés dans les entretoits des maisons. Lors de la période d'hibernation, ils privilégient les bâtiments comme les immeubles et les clochers d'églises, mais aussi les fissures dans les falaises. Chasseurs habiles, ils poursuivent leurs proies principalement au-dessus des cours d'eau et de leurs berges, ainsi qu'en agglomérations.

Reproduction et longévité

Les femelles se regroupent entre mai et août pour mettre bas et forment des colonies de plusieurs dizaines d'individus. Contrairement à d'autres espèces non migratrices, elles ont souvent entre deux et trois petits et non un seul. Les mâles vivent aussi en petits groupes éloignés des maternités. Entre octobre et novembre, ils viennent parader et sont audibles lors de leurs vols près de grands édifices, de ponts ou de falaises. L'âge maximal avéré chez un Vespertilion bicolore est de douze ans.

Menaces

Il est principalement menacé par la destruction de gîtes lors de la rénovation de bâtiments ou les éoliennes sur les routes de migration.

Funfact : Exceptionnellement, la femelle possède quatre tétons, contre deux pour la quasi-totalité des espèces de Suisse. Seules quelques Sérotines communes atteignent, de temps à autre, ce nombre.

¹ Loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

² **EX** : éteint, **EW** : éteint à l'état sauvage, **RE** : éteint en Suisse, **CR** : au bord de l'extinction, **EN** : en danger, **VU** : Vulnérable, **NT** : Potentiellement menacé, **LC** : Non menacé, **DD** : Données insuffisantes

